

Einnahme von Q-Potenzen per Plastikbecher

Entfernen Sie vor der ersten Einnahme den Tropfenzähler(Pipette) vom braunen Arzneifläschchen und leeren Sie ca. einen Drittel der Flüssigkeit aus.

- Vor jeder Einnahme schlagen Sie die Flasche _____mal kräftig gegen Ihre Handfläche oder einen elastischen Gegenstand (z.B. ein Buch).
- Geben Sie dann _____ Tropfen in einen Plastikbecher mit ca. 1dl Leitungswasser.

Rühren Sie die Lösung kurz und kräftig mit einem Plastiklöffel um und nehmen Sie davon einen Schluck ein. Behalten Sie das Wasser ein paar Sekunden im Mund. (WICHTIG: Die Tropfen dürfen nicht mit Metal (Metalllöffel, etc.) in Berührung kommen). Den restlichen Inhalt schütten Sie aus und werfen den Plastikbecher dann weg.

- Stellen Sie die Flasche nach der Einnahme an einen dunklen, strahlungs- und geruchsfreien Ort (Handy, Elektrogeräte, Lampen, etc. schaden dem hom. Mittel)

Vor und nach der Einnahme sollten Sie wenn möglich eine halbe Stunde nichts essen und trinken.

Diese Dosis nehmen Sie _____lang oder bis am _____.

Sollten sich Ihre bestehenden Symptome verschlechtern und/oder neue (evtl. unbekannte) Symptome auftreten, nehmen Sie keine weitere Arznei ein und rufen mich möglichst bald an.

Sobald Sie eine deutliche Besserung Ihrer Beschwerden spüren, pausieren Sie mit der Einnahme. Verschlechtern sich die alten Symptome wieder, starten Sie wieder mit der Einnahme.

Ich erwarte von Ihnen eine telefonische Rückmeldung in _____, bei Bedarf früher.

Sollten Unklarheiten oder Fragen bestehen, rufen Sie mich bitte an. Weitere Informationen finden Sie auch auf www.similibus.ch.

Einnahme von Q-Potenzen direkt auf die Zunge

Entfernen Sie vor der ersten Einnahme den Tropfenzähler (Pipette) vom braunen Arzneifläschchen und leeren Sie ca. einen Drittel der Flüssigkeit aus.

- Vor jeder Einnahme schlagen Sie die Flasche _____ mal kräftig gegen Ihre Handfläche oder einen elastischen Gegenstand (z.B. ein Buch).
- Nehmen Sie 3 Tropfen direkt auf die Zunge.
- Stellen Sie die Flasche nach der Einnahme an einen dunklen, strahlungs- und geruchsfreien Ort (Handy, Elektrogeräte, Lampen, etc. schaden dem hom. Mittel)

Vor und nach der Einnahme sollten Sie wenn möglich eine halbe Stunde nichts essen und trinken.

Diese Dosis nehmen Sie _____ lang oder bis am _____.

Sollten sich Ihre bestehenden Symptome verschlechtern und/oder neue (evtl. unbekante) Symptome auftreten, nehmen Sie keine weitere Arznei ein und rufen mich möglichst bald an.

Sobald Sie eine deutliche Besserung Ihrer Beschwerden spüren, pausieren Sie mit der Einnahme. Verschlechtern sich die alten Symptome wieder, starten Sie wieder mit der Einnahme.

Ich erwarte von Ihnen eine telefonische Rückmeldung in _____, bei Bedarf früher.

Sollten Unklarheiten oder Fragen bestehen, rufen Sie mich bitte an. Weitere Informationen finden Sie auch auf www.similibus.ch.